

シャント造設術で入院された患者様へ

ID () 氏名 ()

日付	/	/	/	/	/
経過	手術前日	手術当日（手術前）	手術当日（手術後）	手術後1日目	退院日
目標	術前準備ができる	安全に手術室に入室することができる	シャント部の安静を保持できる	シャント部の観察ができる シャント管理の実践ができる	
内服	中止する薬があれば説明します				
注射		手術前に点滴をします 	翌日も抗生剤の点滴があるため点滴が終了したら針は固定して置いておきます（希望があれば抜針を抜くことも可能）	手術後2日間抗生剤の点滴があります	
処置	必要時、腕の剃毛をします	手術時間になったら病衣に着替えて、手術室へ行きます	シャント音を数時間おきに確認します（ご自身でもシャント音を確認してみましょう）	医師の許可があればボール握り運動をして血管を強くする運動をします 医師にて手術部位の消毒、包帯交換をします 10日～14日後に傷の糸を抜糸します（早期に退院したい場合は外来での抜糸も可能なことがあります）	
食事	病院食を食べてください	手術前は絶飲食です	帰宅時から水分摂取ができます 帰宅1時間後より食事摂取ができます	病院食を食べてください	
安静	制限はありません	制限はありません	帰宅後より歩行可能です シャント側の腕は安静にしましょう		
排泄		術前に排泄を済ませておいてください			
清潔	制限はありません	制限はありません	入浴できません 清拭、洗髪は可能です	医師の許可があれば、 下半身シャワーができます	
説明 (その他)	手術のオリエンテーションをします 同意書をお預かりします 手術中、ご家族は病室にてお待ちください		シャント肢は血流が悪くなると閉塞の原因となるためシャント側の腕は強く曲げたり、体の下にしないように気をつけましょう 痛みや腫れ、出血など異常があればすぐお知らせください	シャントの自己管理や退院後の生活について説明します 	退院指導にて、日常生活での注意点など再度確認させていただきます

注1 この予定は現時点で考えられるものであり、今後検査治療等を進めていくに従って変更となる場合があります。

注2 入院期間は現時点で予想される期間です。

市立敦賀病院クリティカルパス委員会 2018/05/18 承認

説明日 年 月 日、

説明者署名 () 本人・家族署名 ()